



Rosa Pomponia.

P. A. Robaut pinx.

Rosier Pompon.

Supplément de Bonnet.

Langlois sculp.

LES ROSES

65

ROSA POMPONIA.

R. Germantia submissa, pubescentia peristylis glandulosis hispida; caule aculeis adpressis; foliis ovatis, rugosis, subtus pubescentibus; floribus geminis. (N.)

R. Pomponia. D.C. Fl. Franc. p. 300.

R. Pomponia. Art. Ros. vol. 2, pag. 304.

R. (Gallia. Fac. 1.) Poirer, Encyc. 6, p. 358.

R. (Burgundica) germantia submissa pubescentia peristylis glandulosis hispida; foliis ovatis, subtus pubescentibus. Corolla parva, plena, incarnata; alba, dices obumbrata. Pers. Syn. 13.

R. (Gallia) pomponia. Bot. cultus, Nour. 21. Fac. 11. Nour. Debar. Vol. 7, p. 37.

An perfoliata? Wurm. spec. 2, pag. 1078. Encyc. 6, p. 37.

LE ROSIER POMPON.

DÉSCRIPTION.

Les tiges du Rosier Pompon forment des branches rampantes qui s'élèvent peu; elles sont armées d'aiguillons épars, grêles, presque droits. Les feuilles sont composées de cinq folioles, ovales, ridées, d'un vert clair, tomenteuses en dessous, simplement dentées, un peu ciliées; glanduleuses au leur bord, et portées par des pétioles velus. Les feuilles supérieures n'ont que trois folioles. Les fleurs, d'une odeur suave, le plus souvent disposées deux à deux à l'extrémité des rameaux, sont supportées par des pédoncules hispides concaves, ainsi que l'ovaire et les lobes pétales du calice, de glandes mucos. pédicellées, un peu visqueuses. La corolle très-double, se compose d'un